

## 密閉された空間での使用厳禁

一酸化炭素中毒による死亡事故につながり危険です。

### 安全のために必ずお守りください

#### 密閉された空間での使用厳禁

換気が十分行われない場所で使用し続けると、酸素濃度の低下により不完全燃焼し、一酸化炭素中毒による死亡事故につながり危険です。新鮮な空気が常に供給できるように、空気取入口や排気口を必ず設けてください。



#### 換気必要

使用中は1時間に1～2回必ず換気してください。換気せずに使用し続けると、酸素濃度の低下により不完全燃焼し、一酸化炭素中毒による死亡事故につながり危険です。

### 一酸化炭素中毒の症状

初期症状は、頭痛、吐き気、めまい、倦怠感などですが、呼吸数や脈拍数の増加が起こり、意識があっても身体が自由に動かなくなります。さらに進むと意識がなくなり呼吸が停止し、死に至る場合もあります。

### 救出時の注意

- 1) 救出者が共倒れしないよう、濡れタオルで口・鼻を覆い、息を止めて部屋の換気をする。
- 2) ヒーターをとめる
- 3) 連れ出すときには、引きずるようにする。意識があっても絶対に歩かせない。

### 応急処置

- 1) 安全な場所へ運び、呼吸を確認し、なければ人工呼吸をする。ゆっくり2回、すばやく3回のペースで息をふきこみ、脈がない場合は心臓マッサージをする。
- 2) 意識が戻れば毛布でくるみ体温の低下を防ぎ、安静に寝かせて救急車を待つ。
- 3) 数日、あるいは数週間してから症状が現れる場合があるので、軽症でも必ず医療機関に連れて行く。



## 子供のやけど・火災などの事故を防ぐためのご注意

大人の見えていないところで子供が火傷をする事故が発生しています。

### 安全にご使用いただくために次のことをお守りください。

#### ■子供・動物を近づけさせない

- ・ガードフェンスを使う。(別途、お求めください)
- ・大人がいる場所で使う。
- ・監視できない場合は電源プラグを抜く。

#### ■ヒータが冷えてから離れる

冷却運転終了後でも余熱があります。

#### ■床の温度を高温にしない

- ・ミラーシートを使う。
- ・(別途、お求めください)

#### ■1時間に1～2回換気する


#### ■可燃物を近くに置かない

- ・可燃物は右図の通りはなす。
- ・洗濯物を乾かさない、お湯を沸かさなないなど。

#### ■給油は冷却運転終了後に行う

#### ■点火操作は3回まで

3回以内の操作で点火しない場合は、異常が考えられますので販売店に連絡してください。



- ・日常点検は取扱説明書に従って正しく行ってください。
- ・製品の注意プレートをよく読んで使ってください。